NursRxiv

DOI: 10. 12209/issn2708-3845. 20220721003

作者版权开放(CC BY-NC-ND 4.0) 未经同行评议(NO PEER REVIEW)

# 侧卧位摆放和并发症的预防

张雅萱,赵 莹

(北京中医药大学东方医院,北京 100078)

摘要:本文通过分析近五年来有关侧卧位摆放的相关文献,从充分暴露术野的同时,其体位垫的选择和人员的站位都影响着手术进程,手术室环境特殊,潜在的危险较大,且随时面临突发情况,对手术患者造成一定影响的现状、存在的问题与护理对策等方面,对文献资料进行并归纳与总结。

关键词: 手术室; 侧卧位; 并发症; 预防

体位的摆放<sup>[1]</sup>是手术室十大安全目标之一。手术体位因手术部位、麻醉<sup>[2]</sup>等因素,造成循环生理的改变,对软组织和神经、血管、肌肉保护作用减弱,由于麻醉药物作用,肌肉松弛造成动脉血低于外界压力(体重),血液循环受到较大干扰<sup>[3]</sup>,所以对护理要求尤为严格。手术室护士有必要准确、熟练掌握常用手术体位的安置方法。最大限度保证病人的舒适与安全,降低因手术体位安置不当造成的风险。

# 1 侧卧位的概念

侧卧位是手术较为常用的体位,其中胸外科、骨科、泌尿外科的要求各异,若操作不当容易引起并 发症。

# 2 体位摆放方法

麻醉后,组成3~4人小组,麻醉师站在患者头部,负责观察患者情况,保护气管导管、硬膜外导管,扶托患者头颈部;其他2~3人分别站在手术床两侧,扶托背部、胸腰部及下肢,搬动患者时步调要一致,将患者脊柱向同一纵轴位转动,避免牵拉或损伤;患者取健侧卧位90°,两手臂向前伸展放于双层托手架上,腋下垫一腋垫,距腋窝10cm,约束带固定双上肢;头部下方垫高约20cm后再放上头圈,耳廓置于头圈空隙处;胸背部两侧各垫一大软垫,用骨盆固定架固定,防止身体倾斜晃动,两腿之间垫一软垫,健侧下肢屈曲60°~70°;胸部手术患者,胸下垫一软垫[4]。

### 3 常见的手术并发症预防

# 3.1 脊髓损伤的预防

麻醉后,患者肌肉相对松弛,脊柱和各大小关

节支撑保护不足,医护人员在搬动患者时,对患者身体的每一部位都要有足够的支持,在转换体位时,患者的头颈部、胸腰部、下肢等部位均须设专人负责,统一步调,使患者头颈部、背部同步转动,并始终维持在功能位<sup>[5]</sup>。

#### 3.2 循环系统并发症的预防

侧卧位时因患者局部肢体受压,特别是上肢, 易造成上肢静脉回流障碍,影响循环系统。体位 安置时使用的软垫须备有各种不同的规格,根据 患者的体形选择合适的软垫,以减少腋下侧卧位 手术、胸腔等部位的受压,保证胸廓舒缩正常,维 持正常的静脉回流。

#### 3.3 皮肤、肌肉压伤的预防

侧卧位时身体的主要受力点为健侧肩峰侧面、肱骨外上髁、髂前上棘、股骨外上髁、外踝等部位,由于身体的全部重量都集中在这些部位,且这些部位都为骨隆突处或肌肉、脂肪较薄处,受压时间长易引起皮肤压伤<sup>[6]</sup>。摆放体位时,应仔细检查患者身体每个受力点的情况,对于瘦弱的患者,在骨隆突处增加体位垫加以保护,以缓解局部压力<sup>[7]</sup>。

## 3.4 保护器官避免受损

健侧耳廓应置于头圈空隙处,防止受压,颅脑手术时,患侧耳内塞一棉球,双眼涂红霉素眼膏,贴保护膜,防止消毒液流入耳内、眼内<sup>[8]</sup>。男性患者注意外生殖器的保护,摆放体位时,体位垫放置合理,避免阴茎受压,水肿。

# 3.5 神经麻痹或损伤的预防

麻醉后,患者的运动、感觉消失或迟钝,长时间固定于一种体位,易使患者颈部、四肢等部位因

受压或过度牵拉、旋转而导致神经麻痹或损伤<sup>[9]</sup>。体位摆放时,应注意脊柱的生理弯曲,合理调整头圈的高度和位置;托手架放置合理,双臂外展应小于90°,腋下的软垫大小应根据患者的年龄和体形合理选择,避免损伤臂丛神经<sup>[10]</sup>。

# 4 心理护理

择期手术术前1天访视患者,了解患者的一般情况,向患者介绍手术的必要性、手术室环境、麻醉方法、手术体位,做好心理疏导[11],提高患者对手术的认知程度,取得患者配合[12]。

# 5 小结与展望

侧卧位是外科手术常用体位之一,做好体位 护理,预防护理并发症的发生是手术室护士的职 责。在手术过程中,患者的行为和能力受到限制, 许多感觉无法感知和表达,手术室护士术中应仔 细观察患者的各种心理生理反应,为患者创造一 个安全舒适的手术环境,让患者顺利渡过手术期。

# 参考文献

- [1] 彭元元. 手术室护理之手术室体位摆放及注意事项 [J]. 保健文汇,2020(27):12.
- [2] 任应博,张英. 胸外科手术全麻前后安置侧卧位效果比较[J]. 世界最新医学信息文摘,2019,19(36):70,85.

- [3] 董保芳. 护理干预对侧卧位患者术中压力性损伤的 预防效果[J]. 河南医学研究, 2021, 30(8):1529-1531
- [4] 肖候兰,李文裕,刘庭姣.体位垫在泌尿外科手术侧卧位摆放中的应用效果[J].中国当代医药,2020,27(26):58-60.
- [5] 吴丽珍,柯雅娟,陈运完,等.神经外科侧卧手术体位的摆放与护理[C].//中南六省(区)第十七届神经外科学术会议暨河南省第二十四次神经外科学术年会,2015:627-629.
- [6] 熊璨. 手术患者术中皮肤压力性损伤的发生特征及 预防研究[D]. 武汉:华中科技大学,2019.
- [7] 王琼,李丹. 凝胶体位垫在侧卧位手术中的作用与 护理满意度分析[J]. 医学食疗与健康,2020,18 (4):169,214.
- [8] 苏清彬,彭文君,叶丽群.神经外科侧卧位手术的体位改良联合流程化安置[J].护理学杂志,2021,36 (7);43-46.
- [9] 梁久龙. 浅谈上肢神经损伤与功能重建[J]. 中国美容整形外科杂志,2018,29(6):321-323,327.
- [10] 郑佳林,温霞,陈文局. 改良侧卧位托手架在胸科手术中的应用[J]. 哈尔滨医药,2017,37(6):569-570.
- [11] 王玉华,冷东川. 气管插管全身麻醉患者体验的质性研究[J]. 中西医结合护理(中英文),2017,3 (10);59-61.
- [12] 许妍. 手术室心理护理对择期手术患者舒适度的影响分析[J]. 心理月刊,2020,15(22):146-147.